



Microvit EXCELSOR

Correctores de Carencias

“La solución de la clorosis”

FERTINAGRO

Microvit EXCELSOR



ABONO CE. QUELATO DE HIERRO. AGENTE QUELANTE EDDHA.


Características Principales:

- Producto **sólido sin fracciones gruesas** y de **rápida disolución** en agua.
- **6 % de hierro quelado con EDDHA**; 4,8 % de isómero orto-orto garantizado.
- **Estabilidad asegurada** en valores de pH de 3 a 12.
- De **acción eficaz** en todo tipo de cultivos.
- **Envases** termosellados de **alta resistencia** diseñados para productos higroscópicos.
- **Producto ultrasoluble**, indicado para riego localizado e hidroponía.

Agente quelante EDDHA - Ácido etilendiamino-N,N'-di[(orto-hidroxifenil)acético]:

- **Muy estable** en pH alcalinos.
- Está quelado en su mayoría con isomería orto-orto, la más conveniente para preservar el hierro a disponibilidad de la planta.


PORCENTAJE DE ASIMILACIÓN DE LOS PRINCIPALES MICROELEMENTOS EN FUNCIÓN DEL PH DEL SUELO.



Beneficios Agronómicos:

- **Corrección de la clorosis férrica** (amarilleamiento internerval de las hojas) en suelos calizos.
- **Activación de la fotosíntesis** de las plantas aumentando la producción de fotoasimilados en las hojas.
- **Formación de las proteínas** y de fotoasimilados.
- **Activación** de la **respiración** y **regulación** de la **transpiración**, incluso en momentos de frío y sequía.
- **Recuperación del cultivo** tras asfixia de raíces por encharcamiento.
- Mayor vigor vegetal que provocará un **aumento de la producción**.
- **Optima calidad comercial de los frutos**.

RELACIÓN
Fe QUELADO / QUELATO TOTAL



Dosis orientativas de *Microvit* EXCELSOR:

Cultivo y momento de aplicación	Aplicación al suelo	Riego localizado
Viña:	Cepas jóvenes 3 a 10 gr/pie	2 a 7 gr/pie
	Cepas grandes y parras 15 a 30 gr/pie	10 a 20 gr/pie
Frutales, cítricos y olivos:	Viveros 2 a 5 gr/m ²	-
	Plantones 10 a 15 gr/árbol	5 a 10 gr/m ²
	Árboles inicio de producción 15 a 40 gr/árbol	10 a 25 gr/árbol
	Árboles en plena producción 50 a 100 gr/árbol	25 a 70 gr/árbol
Hortícolas y ornamentales:	Inicio de cultivo 1 a 3 gr/m ²	0,5 a 1 gr/pie
	Pleno desarrollo 3 a 5 gr/m ²	1 a 2,5 gr/pie
Plataneras y tropicales:	Plantas en plena producción 15 a 30 gr/pie	10 a 20 gr/pie

Como norma general aplicar MICROVIT EXCELSOR antes de la brotación de los frutales. En cítricos y olivos se debe repartir la dosis indicada entre primavera y verano, anticipándose también a la brotación. Consulte a nuestro Servicio Técnico para más información.

Distribuido por:



FERTINAGRO

FERTINAGRO NUTRIENTES, S.L.
Empresa del Grupo Turol Trading

Pol. Ind. La Paz, Parcela 185
44195 TERUEL

Tel. 978 61 80 70 - Fax 978 61 72 85
e-mail: info@fertinagro.es

