



fertafol POTEXPRESS

Gama Fertilizantes Foliare



“El seguro de la calidad”

FERTINAGRO

fertafol POTEXPRESS



SOLUCIÓN POTÁSICA LÍQUIDA CON AMINOÁCIDOS

Características Principales:

- Producto **líquido**, de **rápida disolución** en agua y de **mezcla homogénea**.
- **Elevada concentración en Potasio** (30% p/v de K_2O) y en **Azufre** (30% p/v de SO_3).
- **Formulación de reacción neutra** (pH 6,6) para facilitar las **mezclas** y su posterior **aplicación foliar**.
- Enrichido con **sustancias naturales** para mejorar la **penetración** y la **absorción a través de las hojas** de los cultivos.
- **Contiene el complejo MATURPLUS®**, desarrollado por nuestro Departamento de I-D-i, para **optimizar la maduración de frutos y tubérculos**.


El complejo orgánico MATURPLUS®, compuesto por una selección de aminoácidos, vitaminas y polisacáridos, favorece:

- La **maduración uniforme y progresiva de los frutos**.
- El **transporte de azúcares sintetizados en las hojas hacia los racimos, los frutos y los tubérculos**.
- La **síntesis de proteínas incluso en condiciones climáticas adversas**.
- La **correcta transpiración y el máximo aprovechamiento hídrico**.

Beneficios Agronómicos:

- **Aumento del calibre de los frutos**, mejorando su **comercialización**.
- **Mejora de la coloración**, adelantando la **recolección**.
- **Incremento de los niveles de azúcar en los frutos**, optimizando el **sabor y el grado**.
- **Mejor consistencia de la piel**, mejorando su **conservación post-recolección**.
- **Uniformidad de maduración**, regulando la fisiología vegetal y acelerando la **síntesis de proteínas**.
- **Control de la transpiración y del crecimiento**, reduciendo los riesgos de **agrietamiento**.
- **Potenciamiento del efecto de quelatos y micronutrientes**.

RESULTADOS DE CAMPO



fertafol Dosis recomendadas de POTEXPRESS

Cultivo	Momento de aplicación	Aplic.	Dosis
Viña	Después del cuajado y antes del envero (estado L)	1 ó 2	300 a 500 c.c./100 l. de agua
Frutales de hueso	Entre 40 y 20 días antes de la recolección.	1 ó 2	300 a 500 c.c./100 l. de agua
Frutales de pepita	Entre 60 y 20 días antes de la recolección.	2 a 3	300 a 400 c.c./100 l. de agua
Olivar	Entre el endurecimiento del hueso y la maduración.	1 ó 2	300 a 600 c.c./100 l. de agua
Remolacha	Durante el engrasamiento de raíz, con tratamientos fungicidas.	1	3 a 5 l./Ha.
Patata	Post-floración, durante el engrosamiento de los tubérculos.	1 ó 2	3 a 6 l./Ha.
Hortícolas	Entre 45 y 15 días antes de la recolección.	2 a 4	200 a 300 c.c./100 l. de agua

En caso de aplicar en fertirrigación, diluir de 5 a 10 c.c./litro de agua de riego. No mezclar con aceites ni con nitrato de calcio. Consulte a nuestro Servicio Técnico las dosis específicas según tipos de suelos, cultivos, variedades y producciones esperadas.

Distribuido por:



FERTINAGRO

FERTINAGRO NUTRIENTES, S.L.
Empresa del Grupo Turol Trading

Pol. Ind. La Paz, Parcela 185
44195 TERUEL
Tel. 978 61 80 70 - Fax 978 61 72 85
e-mail: info@fartinagro.es

